

# ACYCLOVIR

## Tablet

### KOMPOSISI

#### Acyclovir tablet 200 mg

Tiap tablet mengandung Acyclovir ..... 200 mg

#### Acyclovir tablet 400 mg

Tiap tablet mengandung Acyclovir ..... 400 mg

### FARMAKOLOGI

Acyclovir adalah zat antivirus yang sangat aktif secara *in vitro* melawan virus herpes simplex (HSV) tipe I dan II, serta virus varicella zoster. Setelah masuk ke dalam sel terinfeksi, Acyclovir terfosforilasi membentuk senyawa aktif Acyclovir trifosfat. Tahap awal proses tergantung pada enzim *viral-coded thymidine kinase*. Acyclovir trifosfat berperan sebagai inhibitor dan substrat untuk *herpes-specified DNA polymerase* yang mencegah sintesis DNA virus tanpa mempengaruhi proses sel normal.

### INDIKASI

#### Sediaan tablet :

Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh herpes simplex pada kulit dan membran mukosa, termasuk herpes genital awal dan kambuhan, pencegahan infeksi herpes simplex pada pasien *immuno-compromised*.  
Pengobatan infeksi herpes zoster.

### KONTRAINDIKASI

Pasien yang hipersensitif terhadap Acyclovir.

### INTERAKSI OBAT

Probenesid meningkatkan t<sub>1/2</sub> obat dan AUC plasma.

### PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Acyclovir pada wanita hamil hanya diberikan apabila pertimbangan manfaat lebih besar dari pada resiko yang mungkin timbul.
- Hati-hati pemberian pada wanita yang sedang menyusui.
- Jangan diberikan melebihi dosis, frekuensi penggunaan, dan lamanya pengobatan yang dianjurkan.

### EFEK SAMPING

#### Sediaan oral :

- Gatal-gatal / *skin rash*
- Gangguan gastrointestinal, termasuk : *nausea, vomiting*, diare, dan nyeri abdominal.
- Peningkatan sementara enzim-enzim yang berhubungan dengan bilirubin dan liver, sedikit peningkatan urea darah dan kreatinin; sakit kepala, reaksi neurologis dan fatigue.

### DOSIS DAN CARA PEMBERIAN

#### Sediaan oral :

##### Dewasa

- Pengobatan infeksi herpes simplex :

200 mg, 5 kali sehari dengan interval 4 jam, selama 5 hari, tetapi pada beberapa infeksi awal pengobatan dapat diperpanjang.

Pada pasien *immuno-compromised* (misal : setelah transplantasi sumsum) atau pasien dengan kerusakan absorpsi usus, dosis dapat ditingkatkan menjadi 400 mg.

Pemberian obat harus diberikan sesegera mungkin setelah terjadinya infeksi.

- Pencegahan herpes simplex :

200 mg, 4 kali sehari dengan interval 6 jam.

Pada beberapa pasien *immuno-compromised* (misal setelah transplantasi sumsum) atau pasien kerusakan absorpsi usus, dosis dapat ditingkatkan menjadi 400 mg. Lama pemberian obat disesuaikan dengan periode resiko.

- Pengobatan herpes zoster :

800 mg, 5 kali sehari dengan interval 4 jam, selama 7 hari.

#### Anak-anak usia lebih dari 2 tahun :

Sama dengan dosis dewasa

#### Anak-anak usia kurang dari 2 tahun :

Diberikan setengah dosis dewasa untuk pengobatan herpes simplex dan profilaksis herpes simplex.

### KEMASAN

#### Acyclovir tablet 200 mg

Box 5 strip @ 10 tablet

No. Reg. GKL0108504810A1

#### Acyclovir tablet 400 mg


Box 5 strip @ 10 tablet

No. Reg. GKL0108504810B1

Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya

### HARUS DENGAN RESEP DOKTER

**HJ** HEXPHARM JAYA  
A Kalbe Company  
BEKASI - INDONESIA



Produk : **ACYCLOVIR**  
- Ukuran : 100 X 230 mm  
- Bahan : HVS 60 g/m<sup>2</sup>  
- Kode : BA0903

Warna :  
- Dasar : Putih  
- Nama Produk : Hitam  
- Teks : Hitam  
- Logo Generik HJ : Hitam

Jenis dan besar huruf :  
- Nama produk generik : Tahoma bold 24 pt

- Dibuat oleh : tdw  
- tanggal : 26.03.12

catatan  
- pembagian warna ini hanya sebagai print out

